

# Der Einfluss okklusaler Faktoren auf das Behandlungsergebnis: Eine Studie mit 109 konsekutiven Patienten mit implantatgestütztem festsitzenden Zahnersatz im Unterkiefer und Totalprothesen im Oberkiefer

Wennerberg A, Carlsson GE, Jemt T.

Influence of occlusal factors on treatment outcome: a study of 109 consecutive patients with mandibular implant-supported fixed prostheses opposing maxillary complete dentures.

Int J Prosthodont. 2001 Nov-Dec;14(6):550-5.

Die 109 in die Untersuchung einbezogenen Patienten waren im Unterkiefer nach dem Brånemark-System mit Implantaten und Zahnersatz versorgt worden und wurden über einen mittleren Zeitraum von acht Jahren nachbeobachtet. Die große Mehrheit der Patienten war mit dem Behandlungsergebnis und der damit verbundenen kaufunktionellen Situation sehr zufrieden. Zwei Drittel der Probanden hatten keine Probleme mit den herausnehmbaren Totalprothesen im Oberkiefer. Bei 61,0 % der Probanden lag eine bilateral balancierte Okklusion vor und bei 4,0 % konnte eine unilateral balancierte Okklusion ermittelt werden. Bei 8,0 % der Probanden lag eine nach gängigen prothetischen Kriterien schlechte Okklusionssituation vor.

**Schlussfolgerung:** Okklusale Faktoren hatten kaum einen Einfluss auf die Patientenzufriedenheit und das Behandlungsergebnis.

Letzte Aktualisierung am Donnerstag, 12 February 2019