

Wissenschaftliche Kurzinformationen (Abstracts) zum Thema Knochenaufbau mit Wachstumsfaktoren

Die Wirkung von Plättchenreichem Plasma nach Entfernung retinierter unterer Weisheitszähne: Ein systematischer Review

Barona-Dorado C, González-Regueiro I, Martín-Ares M, Arias-Irimia O, Martínez-González JM.

□Efficacy of platelet-rich plasma applied to post-extraction retained lower third molar alveoli. A systematic review.

Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2014 Mar 1;19(2):e142-8.

Um den Einfluss von PRP auf die Komplikationsraten nach Entfernung retinierter Weisheitszähne im Unterkiefer zu ermitteln, eine systematische Literaturrecherche nach RCT durchgeführt. Von insgesamt 101 Studien erfüllten drei die Einschlusskriterien.

Aufgrund der eingeschränkten Studienqualität und dem damit verbundenen Verzerrungsrisiko, war eine eindeutige Evidenz eines positiven Einflusses auf den Heilungsverlauf nach dem chirurgischen Eingriff nicht erkennbar und es konnte keine eindeutige Empfehlung des routinemäßigen Einsatzes von PRP nach der Entfernung retinierter Unterkiefer-Weisheitszähne abgegeben werden.

Letzte Aktualisierung am Samstag, 01. März 2014