

Wissenschaftliche Kurzinformationen (Abstracts) zur implantologischen Therapie: Sofortimplantation/

Verhalten der bukkalen krestalen Knochenlevel nach Sofortimplantation und Sofortbelastung

Lemes Hd, Sartori IA, Cardoso LC, Ponzoni D.
Int J Oral Maxillofac Surg. 2015 Mar;44(3):389-94.

Bei 12 Patienten wurde unmittelbar nach Extraktion des mittleren oder seitlichen Oberkiefer-Schneidezahns ein Implantat mit einem Morse Taper-Abutment eingesetzt. Vor der Extraktion sowie einen Tag und sechs Monate nach Sofortimplantation und Sofortbelastung wurden Computertomografien (CT) hergestellt, um die Höhe und den Verlauf der bukkalen Knochenwand zu dokumentieren. Die Messungen wurden an drei Messpunkten durchgeführt. Diese lagen im Zentrum der Alveole (1) sowie 1,0 mm mesial (2) und 1,0 mm distal (3) des zentralen Messpunkts.

Nach sechs Monaten konnte eine statistisch signifikante, uneinheitlich voranschreitende, nach apikal gerichtete Resorption der krestalen Knochenlamelle ermittelt werden.

Letzte Aktualisierung am Sonntag, 01. März 2015